

หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร?

1. ถ้าแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงกับแผล และล้างออกให้หมด (ถ้าเข้าเป็นเวลาานาน 15 นาที) การล้างแผล จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**
2. ทายาบนแผล และรีบพาพบแพทย์ โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษา และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
3. กักสุนัขเพื่อดูอาการ **10 วัน** ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้า
4. ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด และควรเข้ารับวัคซีน ให้ตรงตามนัดแพทย์

ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร?

- หลักกติก **5 ย.** ได้แก่
- “อย่าเหยย อย่าเหยยบ อย่าแยก อย่าเหยยบ อย่าเหยง”
1. **อย่าเหยย** ให้สุนัขไปเหยย
 2. **อย่าเหยยบ** สุนัข หรือทำให้ตกใจ
 3. **อย่าแยก** สุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า
 4. **อย่าเหยยบ** รับประทานอาหาร หรือของที่สุนัขขวาง
 5. **อย่าเหยง** กับสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่ในกรงประ-วัติวัคซีน



โทรสายด่วน 1422





กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH



โรคพิษสุนัขบ้า



สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า



มีอาการอย่างไร?

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้

3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก



มีอาการและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง

2. ระยะตีบตัน



กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก จึงเลิกกินหรือสัตว์

3. ระยะอัมพาต



ค้างคาง ลิ้นห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวงกบ กบ เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วย การฉีดวัคซีน



ป้องกันยังไม่ใช้วัคซีน



ติดต่อได้ทางไหนบ้าง?

สามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน

ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แผลขนาดเล็กน้อยก็สามารถติดต่อได้



2. ถูกสัมผัสกับนมและ รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน

รวมทั้งรูมีปากหรือรอยขีดข่วน



อาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ

3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

• อาการเริ่มแรก:

ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร



อ่อนเพลีย และคันรูมรุมบริเวณแผลที่ถูกกัด

• อาการทางประสาท:

กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย

กลัวแสง กลัวลม น้ำขอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น

กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว



• อาการระยะสุดท้าย:

กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก เมื่อนำอาหารลงท่ายใจไม่ออก เม้มหน้าอก หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด

